



Reconstruction en céramique

Après le traitement

Votre occlusion (la façon dont vous fermez les dents) devrait être la même qu'avant le traitement et ne devrait pas engendrer de douleur à la mastication. Nous faisons de notre mieux pour ajuster votre occlusion, mais il est difficile d'être certain que l'occlusion est ajustée convenablement sous l'effet de l'anesthésie locale. Lorsque vous n'aurez plus l'effet de l'anesthésie, si vous ressentez un inconfort à la mastication avec votre nouvelle restauration, revenez à la clinique pour un ajustement. Cela ne se replacera pas tout seul et la dent risque de devenir très sensible.

Une sensibilité au niveau de la gencive et/ou au site de l'anesthésie est normale et devrait disparaître dans les jours suivant l'intervention. Pour minimiser l'inconfort, vous pouvez prendre des analgésiques en vente libre de type ADVIL, MOTRIN ou TYLENOL.

Une sensibilité pourrait survenir au froid et durer quelques jours, voire quelques semaines. C'est un phénomène de guérison interne de la dent. Si jamais vous ressentez des douleurs intenses au chaud ou au froid, il faut communiquer avec nous le plus tôt possible.

Vos restaurations sont de très grande qualité grâce à la technologie CEREC. Vous venez de faire le meilleur investissement à long terme pour votre santé dentaire!

N.B. : Un brossage régulier, l'utilisation de la soie dentaire ainsi qu'une diète faible en sucre sont essentiels pour conserver une excellente santé dentaire. Vos examens et nettoyages réguliers à tous les six mois (ou adaptés à vos besoins) permettront de conserver une santé buccale optimale.

Merci de votre confiance!

L'équipe de la Clinique Dentaire Disraeli